Галофур (Galofurum).

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: галофугинон.

Лекарственная форма: раствор для орального применения.

Галофур представляет собой прозрачный раствор от светло-желтого до темно-желтого цвета.

В 1,0 мл препарата содержится 0,5 мг галофугинона (в форме лактата), вспомогательные вещества: тартразин Е102, спирт бензиловый, кислота молочная, вода очищенная.

Препарат выпускают в полимерных флаконах по 100 мл, 500 мл и 1000 мл.

Галофур хранят по общему списку при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. После вскрытия флакона препарат необходимо хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, использовать в течение 12 месяцев. Не использовать по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте.

Уничтожение препарата с истекшим сроком годности проводится в соответствии с действующим законодательством.

Условия отпуска – без рецепта ветеринарного врача.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Галофур относится к антипротозойным лекарственным препаратам. Галофугинон является производным хиназолинона, принадлежащим к группе азотосодержащих полигетероциклов.

Галофугинон обладает антипротозойной активностью в отношении *Cryptosporidium parvum*.

Галофугинон действует, главным образом, на свободные стадии развития паразита (спорозоит, мерозоит), оказывая криптоспоридиостатическое действие.

Максимальная концентрация в плазме крови наблюдается через 11 часов после орального введения.

Галофугинон выводится в основном с мочой в неизменном виде.

Галофур по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Галофур применяют телятам с лечебно-профилактической целью при криптоспоридиозе.

Галофур применяют телятам внутрь, индивидуально после кормления, или выпаивают с индивидуальной порцией молока в дозе 2 мл на 10 кг массы тела животного (0,1 мг галофугинона на 1 кг массы тела животного) один раз в сутки в течение 7 дней.

Для упрощения расчетов можно применять следующие схемы (таблица 1):

Таблица 1

Масса теленка	**Доза препарата**
35-45 кг	8 мл
46-60 кг	12 мл

С лечебной целью, применение препарата необходимо начинать в течение 24 часов после начала диареи, вызванной криптоспоридиями.

Для животных массой менее 35 кг или более 60 кг необходим индивидуальный расчет дозы. Каждый день лечение необходимо проводить в одно и то же время. В течение лечения телята должны получать достаточное количество молозива или молока.

С профилактической целью препарат применяют телятам в первые 2 суток жизни.

Для предотвращения распространения криптоспоридиоза в хозяйстве, лечение и профилактику необходимо проводить на всем поголовье телят.

Необходимо точно дозировать препарат, так как симптомы передозировки могут проявляться уже при двукратном увеличении терапевтической дозы. При передозировке возможны диарея, появление крови в фекалиях, снижение аппетита, обезвоживание, угнетение. В случае появления признаков передозировки, применение препарата необходимо прекратить и назначить симптоматическое лечение.

Запрещается применять препарат ослабленным животным, а также телятам, у которых диарея продолжается более 24 часов. Запрещается задавать препарат животным до кормления.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

Сведения о несовместимости препарата с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками отсутствуют.

Препарат запрещено применять животным, чьё молоко используется в пищу людям.

Убой телят на мясо разрешается не ранее 15 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее указанного срока, мясо животных можно использовать для кормления плотоядных животных.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.