«Виметрил 100» – инъекционный препарат широкого спектра действия, используется для лечения инфекций бактериальной и микоплазменной этиологии у молодняка с/х животных и птицы. В качестве действующего вещества в 1 мл препарата содержится: энрофлоксацин – 100 мг, L-аргинин – 200 мг, вспомогательные вещества – до 1 мл.

Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: антибактериальное средство. Энрофлоксацин, входящий в состав лекарственного средства обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и микоплазм, в том числе E.coli, Salmonella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa, Bordetella, Campylobacter spp., Erysipelothrix, Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., Bacteroides spp., и Mycoplasma spp. Механизм бактерицидного действия энрофлоксацина заключается в подавлении репликации ДНК в микробной клетке, что приводит к гибели микроорганизма. Энрофлоксацин быстро всасывается из места инъекции и проникает во все органы и ткани организма, выделяется преимущественно с мочой и с желчью.

Показания к применению

Назначают животным при инфекциях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, септицемии, колибактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, бактериальной и энзоотической пневмонии, атрофическом рините, синдроме ММА и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину.

Дозировка и способ применения

Внутримышечно, подкожно. Однократно. Перед применением тщательно встряхнуть.

КРС: в дозе 1 мл на 20 кг живого веса.

Свиньи, козы, овцы: в дозе 7,5 мл на 100 кг живого веса (эквивалентно 7,5 мг энрофлоксацина на 1 кг живого веса). Препарат следует вводить в количестве не более 15 мл в одно место крупному рогатому скоту и не более 5 мл свиньям.

Противопоказания

Не применять препарат лактирующим животным. Не рекомендуется применять «Виметрил 100» одновременно с бактериостатическими антибиотиками и нестероидными противовоспалительными средствами. При применении в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не наблюдается.

Период выведения

Мясо: через 14 суток после последнего применения препарата.

Условия хранения

Срок годности – 3 года с даты выпуска. После вскрытия флакона препарат следует хранить в холодильнике в течение 28 дней. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре 0°С до 25°С.

Форма выпуска

Флаконы объемом 100 мл.