Комплексный антибактериальный препарат, содержащий в качестве действующих веществ триметоприм и сульфадиазин. Выпускают в виде плоских таблеток белого или сероватого цвета с риской посередине таблетки, массой 0,6 г. Расфасовывают в пластиковые банки по 70 таблеток.

СОСТАВ

Каждая таблетка Сульфа 480 содержит 80 мг триметоприма и 400 мг сульфадиазина.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Триметоприм и сульфадиазин, входящие в состав препарата, обладают синергидным действием, оказывают бактерицидное воздействие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания. «Сульф» нарушает биосинтез фолиевой кислоты и блокирует метаболизм тетрагидрофолиевой кислоты, необходимых для развития бактерий. Препарат быстро всасывается в кровь и проникает во все органы и ткани животного. Максимальная концентрация Сульфа в крови отмечается через 3 - 4 часа после применения и удерживается не менее 12 часов. Препарат выводится из организма с мочой.

ПОКАЗАНИЯ

Сульф применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота, жеребятам, свиньям и пушным зверям для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи, раневых инфекций, пастереллеза, сальмонеллеза и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к препарату.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат дают животным в смеси с кормом, или предварительно растворив в воде или молоке. Суточная доза: Сульф-гранулят - 5 г (полная мерная ложка) на 20 кг, Сульф-480 - 1 таблетка на 16 кг массы животного. Суточную дозу препарата дают в два приема с интервалом в 12 часов. Курс лечения 5–7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к активным компонентам препарата, нарушения функций органов кроветворения, печени и почек, беременным и лактирующим животным.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается. При повышенной чувствительности к сульфаниламидам возможны аллергические реакции.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 9 дней после последнего применения препарата. Мясо вынужденно убитых животных может быть использовано для изготовления мясокостной муки.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить препарат с предосторожностью (список Б), в заводской упаковке, в защищенном от света и влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре не выше 25°С. Срок годности — 2 года.

УПАКОВКА

Выпускается раффасованным в полимерные банки по 70 таблеток.