Масло Камфорное 10%



Инструкция по применению Масла камфорного 10% для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата у животных и субклинического мастита у коров в сухостойный период
(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Масло камфорное 10% (Oleum camphoratum 10%).
Международное непатентованное наименование: камфора.

Лекарственная форма: масляный раствор для наружного применения.
Масло камфорное 10% содержит в 100 мл в качестве действующего вещества 10 г камфоры, а в качестве вспомогательного вещества - масло подсолнечное до 100 мл.
По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость желтого цвета с запахом камфоры.

Выпускают Масло камфорное 10% расфасованным в стеклянные флаконы с винтовой горловиной, укупоренные полимерными пробками и закрытые полимерными навинчиваемыми крышками или полимерными навинчиваемыми крышками с контролем вскрытия; или в стеклянные флаконы и бутылки, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками; или в полимерные флаконы, закрытые полимерными навинчиваемыми крышками. Каждая упаковка снабжена инструкцией по применению.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания.и кормов, при температуре от 0°С до 20°С.
Срок годности Масла камфорного 10% при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства.
Запрещается применять Масло камфорное 10 % по истечении срока годности.

Масло камфорное 10% следует хранить в местах, недоступных для детей.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Масло камфорное 10% относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения опорно-двигательного аппарата у животных.
Камфорное масло оказывает антисептическое, местное раздражающее, местное анальгезирующее, противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляцию в области нанесения. При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

По степени воздействия на организм Масло камфорное 10% согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

Масло камфорное 10% применяют животным для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (артритов, бурситов, миозитов, тендовагинитов, ушибов) и субклинического мастита у коров в сухостойный период.

Противопоказанием к применению Масла камфорного 10 % являются нарушения целостности кожного покрова и индивидуальная повышенная чувствительность животного к камфоре.

Масло камфорное назначают наружно в виде растираний. Масло наносят тонким слоем на участок кожи в области воспалительного процесса и легкими массирующими движениями втирают в течение 2-3 минут 1-2 раза в сутки на протяжении 7-10 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Симптомы передозировки у животных не выявлены.
Особенностей действия лекарственного препарата при первом применении и его отмене не установлено.
Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.
Побочных явлений и осложнений при применении Масла камфорного 10% в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты.

Масло камфорное 10% не следует назначать одновременно с другими лекарственными препаратами для местного применения.

Не рекомендуется применение Масла камфорного 10% перед убоем.

Продукты животноводства, в том числе молоко, можно использовать без ограничений через 48 часов после последнего применения препарата.
Молоко, полученное ранее установленного срока, используют после кипячения на корм пушным зверям.
В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо и субпродукты используют на корм зверям.

IV. Меры личной профилактики

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.
При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с маслом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в лечебное учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы (бутылки) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизаций с бытовыми отходами.

Организация-производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», Россия, 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.
Адрес места производства: Россия, 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.