Энрофлон пенообразующие таблетки



Состав и форма выпуска

Антибактериальный препарат, содержащий в качестве действующего вещества энрофлоксацин (0,36 г в каждой таблетке). По внешнему виду представляет собой продолговатые таблетки с закругленными краями и гладкой однородной поверхностью, сухой твердой консистенции от светло-серого до серо-желтого цвета. Выпускают в коробках по 10 или 20 шт.

Фармакологическое действие

Энрофлоксацин, входящий в состав пенообразующих таблеток, обладает широким спектром антибактериального действия, подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе E. coli, Haemophilus, Klebsiella, Pasteurella, Pseudomonas, Bordetella, Campylobacter, Erysipelotrix, Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Actinobacillus Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, а также Mycoplasma spp. Резистентность бактерий к энрофлону развивается относительно медленно, т. к. механизм противомикробного действия энрофлоксацина связан с ингибированием активности фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в бактериальной клетке. Благодаря пенообразующей основе, энрофлоксацин равномерно распределяется по слизистой оболочке матки. Выделяющаяся двуокись углерода усиливает резорбцию лекарственного вещества, способствует проникновению его в более глубокие слои эндометрия.

Показания

Профилактика и лечение воспалительных процессов в матке после родовспоможения оперативного отделения последа, абортов, при осложненных и патологических родах, при острых послеродовых эндометритах.

Дозы и способ применения

С профилактической целью энрофлон вводят однократно по одной таблетке сразу после отделения последа, аборта или оказания помощи при осложненных и патологических родах. С лечебной целью препарат вводят в дозе 1 2 таблеток с интервалом 24 часа 2 - 3 раза до клинического выздоровления. Таблетки вводят в шейку матки рукой, одетой в полиэтиленовую перчатку разового пользования, или с помощью корнцанга, и проталкивают в полость матки.

Побочные действия

В рекомендованных дозах не наблюдаются.

Противопоказания

Не установлены.

Особые указания

Молоко, полученное от коров во время лечения и в течение 72 часов после последнего применения препарата, используют в корм животным после кипячения. Убой животных на мясо и применение молока в пищевых целях допускается через 72 часа после последнего применения

препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, используют в корм плотоядным животным или для производства мясо-костной муки.

Условия хранения

Список Б. В сухом, темном месте при температуре не выше 25 ºС. Срок годности - 3 года.